ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C 26 N 32

Raport des trois observations que M Cullerier Chirurgien gagnant maîtrise en Chirurgie a Bicêtre a lües dans l'une des dernieres Seances de L'accademie Sur la cure radicale de L'hydrocelle

Le nommé Baudouin âgé de 22 ans portait depuis 20 mois une hydrocelle. Cette tumeur Se portoit jusqu'à L'anneau. en comprimant elle diminuait d'un Tiers de Son volume.

Nous ne Suivrons point M Cullerier dans le traittement qu'il a employé. l'on reconnait en lui L'homme qui a reçu des bons principes et qui sçait les mettre à profit dans les cas difficiles.

Son observation nous presente une question qui pourroit être de quelque utilité; si nous parvenions à la resoudre. L'hidrocelle qui fait l'objet de cette observation, étoit-elle avec hernie? M. Cullerier ne le croit pas. nous ne pouvons nous Empêcher d'être d'un Sentiment contraire au Sien; mais avant de combattre son opinion, nous allons rapporter Litteralement les preuves Sur lesquelles il s'appuye.

L'opération faite, la playe fut pansée avec

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

l'appareil convenable. elle parcourut ses différens periodes sans aucun accident. mais dans le tems que la cicatrice étoit très avancée il se declara une tumeur vers l'anneau qui augmentait tous les jours et en comprimant elle disparaissait; étoit-ce une hernie? continue-t-il; étoit-ce une nouvelle tumeur acqueuse? M Cullerier, aprés s'être fait ces deux questions, il n'hesite point à croire que cette derniere maladie étoit une hydrocelle survenüe aprés la guerison de la premiere. d'aprés l'exposé de M Cullerier nous croyons qu'il s'est trompé sur la nature de la derniere tumeur qu'il a guerie. nous sommes persuadés que le nommé Baudoin avoit une hydrocelle avec hernie; que la premiere a été guerie par excision et la derniere en detruisant le sac herniaire par la pierre à cauterre. voici nos preuves.

La tunique vaginale n'a d'étendüe qu'autant qu'il lui en faut pour envelopper le testicule. sa dilatation dans L'hydrocelle depend des eaux qui s'amassent progressivement entre elle et L'albuginée.

Supposons pour un moment que la tumeur enkistée dont il est question, soit comprimée

dans quelques uns de ses points; pourra-t-on
Concevoir sa diminution par la seule compression
qu'on exercera sur Elle?

Pourque cela arrivât il faudrait supposer
deux choses, l'une que les liquides sont
susceptibles d'être comprimés, l'autre qu'il éxistât
un vuide entre la tunique vaginale et le testicule
et que cette cavité pût recevoir naturellement et
sans éffort les Eaux qui pourroient s'y amasser
accidentellement; nous savons tous qu'on ~~[illegible]~~
n'a pas encore trouvé le moyen de reduire les
fluides, et l'anatomie nous apprend que la
dilatation des Membranes qui renferment les
Eaux dans les hydrocelles est entièrement passive.

Dans le Cas raporté par M Cullerier,
la troisieme partie de la tumeur disparaissait
quand on la comprimait, Elle étoit donc
independante de l'hydrocelle selon les principes connus.

L'idée de la hernie se presente ici d'Elle
même pour la joindre à L'hydrocelle et former
ensemble ce que nous connoissons sous le nom
d'hydro-enterocelle, elle seule disparaissait
par la compression, et une fois reduite la situation
du Malade suffisait pour l'empêcher de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

reparoitre. au milieu de la Cure elle reparut mais en comprimant elle disparaissait, dit M Cullerier; je demande à mon tour, si c'eût été une seconde hydrocelle, auroit-elle disparut? ; j'avoüe naturellement que je ne le conçois pas. mais voyons, si je serai plus heureux en suivant l'auteur dans la cure de cette derniere maladie.

Je fus obligé d'employer la pierre à Cautere que je cachais dans un emplâtre de diachilon Leschare fut profonde, la tumeur disparut en peu de jours et j'ai vu le malade un an aprés sans apparence de retour.

Comment concevoir qu'en peu de jours le sac qui contenoit les Eaux ait pu s'exfolier au point d'assurer la guerison d'une maladie dont la moindre partie du Kiste aprés bien du tems, bien de la peine donne lieu à une tumeur semblable à celle qu'on a voulu détruire.

Dans quel tems Leschare est-elle tombée? a t-elle occasionné une inflammation generale du Kiste? comment les Eaux se sont-elles Evacuées, a t-on vu le Sac à decouvert

et en a-t-on Suivit L'exfoliation.

Rien de tout cela n'est raporté dans l'observation et c'est cependant ce qui l'auroit rendüe interessante à l'accademie.

Nous croyons donc que le Malad dont il est question étoit une hydroenterocelle ; que L'hydrocelle a été guerie par l'excision du sac et la hernie par la pierre à cautere qui a resserré le Sac herniaire prés de l'anneau.

L'auteur merite des remerciemens de la part de l'accademie

2e Observation

un homme âgé de 55 ans fut transporté au mois d'août 1788 dans une infirmerie de Bicêtre avec les Symptômes d'une hernie Etranglée. M Daunan alors Chirurgien en second fit beaucoup de tentatives pour reduire La Tumeur. Le lendemain lorsque je vis le malade pour la premiere fois les accidents n'existoient plus ; mais il restait une tumeur trés volumineuse qu'il portoit depuis huit ans. aprés un Examen attentif je n'eut plus de doute sur l'existence d'une hydrocelle, le malade consentit à

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

l'operation que je lui proposai.

La playe a été pausée, comme il est d'ordinaire, le cordon étoit très gonflé lorsque je levai le premier appareil, mais il a diminué peu à peu et est revenu à l'Etat naturel.

Quand le malade a commencé à marcher il lui est survenu une hernie intestinale du côté operé.

Nous avons vû dans la premiere observation une hydr- enterocelle, dans celle ci il paraît au contraire que la hernie est survenüe après l'operation de l'hydrocelle, il reste à savoir si elle depend de l'excision du tissu cellulaire qui étoit aux environs de l'anneau, comme le pense M. le Brun, ou du gonflement considerable du Cordon des Vaisseaux Spermatiques. M. Le Brun n'a que des probabilités au lieu que nous croyons avoir des raisons certaines pour prouver notre sentiment.

Les Symptômes que M. Daumas prit pour appartenir à une hernie avec Etranglement étoient illusoires, ils dependaient d'un Gonflement inflammatoire du Cordon

du tertícule, en effet aprés l'operation de L'hydrocelle par éxcision M Cullerier le trouva trés gros et trés gouflé et ne revint dans son état naturel qu'à la fin de la guerison.

Ne semble-t-il pas naturel de trouver la cause de la hernie à la dilatation de L'anneau des Muscles du bas ventre, par le gouflement contre nature du cordon et sa diminution subite aprés l'opération. n'a-t-elle pas aussi facilité l'issüe des intestins dans l'aine; du moins ce sont les raisons qui nous ont paru le plus approcher de la verité

Cette observation ne presente rien de nouveau Cependant son auteur merite des remerciemens de la part de l'accademie pour l'Encourager à se rendre utile dans des circonstances plus heureuses à cette Compagnie

3e Observation

M Cullerier a fait l'opération de L'hydrocelle par éxcision à un homme de 35 ans. je ne rapporterai point la maniere avec laquelle il l'a faite elle lui fait honneur, mais

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

elle n'interesse nullement la Compagnie
la playe est actuellement très belle, le
Testicule est couvert de Bourgeons vasculeux
et la cicatrice commence à se faire. ~
ainsi finit l'auteur de ces trois observations ./.

[signature]

No. 6